

Megkezdődött az FD betegség felismerése szempontjából legfontosabb időszak

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a figyelmet arra, hogy megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság (FD) betegség felismerése, amely a fertőzés megakadályozása szempontjából a legfontosabb időszak. A szőlőültetvényekben a tünetek július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése, a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése.

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség a nyári időszakban válik különösen jól felismerhetővé. A vegetációs időszak közepétől a termelőknek és a hobbikertekben szőlőt nevelőknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az ültetvények rendszeres átvizsgálására. Ebben az időszakban jelennek meg ugyanis a betegségekre legjellemzőbb levéltünetek és a fertőzés gyors terjedésének jelei.

Jellegzetes nyári tünetek

A fertőzött tőkék már a nyár elejétől kezdve eltérően viselkednek az egészséges növényekhez képest. A hajtásnövekedés gyengül, az ízközők rövidülnek, a tőkék fejlődése és a fásodás folyamata lelassulhat. A fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő-fajták esetében vörösödés figyelhető meg, emellett gyakori a levél fonáka felé irányuló háromszögyszerű sodródás, a fémes levélfelület, valamint a hajtások és a termés fejlődésének visszamaradása. A fűrtképződés és a termés is érintett lehet már a nyári időszakban. A nyár második felében, különösen augusztus-szeptember környékén a tünetek tovább erősödnek. A leveleken a főerek mentén sárgás foltok jelennek meg, majd a teljes levél elszáradhat. A fertőzött vesszők nem érnek be megfelelően, ami a következő évi termőképességet is jelentősen rontja. Ez az időszak a betegség gyors terjedésének is kedvezhet, mivel a már korábban is fertőző lárvák (L3-L5) mellett megjelentek az amerikai szőlőkabóca imágói is. Az utolsó fejlődési szakaszukat elért kabócák a lárváknál sokkal nagyobb mozgékonyaságuk miatt még hatékonyabban terjeszthetik a kórokozót. Ezért fontos az ültetvények rendszeres ellenőrzése, a sárga ragacs lapos megfigyelésekre alapozott védekezés, valamint a gyanús tüneteket mutató tőkék mielőbbi azonosítása. A terepi megfigyelésen fontos jelzés lehet a fertőzött tőkék elhelyezkedése. Az FD jellemzően foltoszerűen, a fertőzött tőkék környezetében terjed – mivel a fő vektor, az amerikai szőlőkabóca mozgása és helyi táplálkozási szokásai a szomszédos növényekre korlátozódnak – míg a hasonló tüneteket okozó egyéb sárgulások általában szórtan jelennek meg az ültetvényben.

Az aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma karantén károsító, amely ellen jelenleg nem áll rendelkezésre közvetlen növényvédő szeres megoldás. A védekezés alapját többek között a fertőzött tőkék gyors felismerése és eltávolítása, valamint a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony rovarölőszeres védekezés jelenti.

Gyanú esetén a fertőzött tőkéket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel a betegség gyorsan terjed, és súlyos következményekkel járhat. A tüneteket haladéktalanul jelezni kell a [területileg illetékes kormányhivatalnak](#), [valamint a Nébih-nek](#), mivel a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításához.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány, valamint a témában minden további hasznos információ elérhető a Nébih tematikus aloldalán: <https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg>

További információ és fotók:

<https://portal.nebih.gov.hu/-/megkezdodott-az-fd-betegseg-felismerese-szempontjabol-legfontosabb-id>

[oszak](#)

Sajtókapcsolat:

- +36 70 436 0384
- nebih@nebih.gov.hu

Eredeti tartalom: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Továbbította: Helló Sajtó! Üzleti Sajtószolgálat

Ez a sajtóközlemény a következő linken érhető el:

<https://hellosajto.hu/?p=31956>